

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ойский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению
развития детей»

Информирование родителей «Осторожно, укусы насекомых! Меры предосторожности для детей и взрослых»



Подготовила: воспитатель
разновозрастной группы
(от 1 года до завершения образовательных отношений)
Иванова Алёна Владимировна
662830, Красноярский край
Ермаковский район, п.Ойский
пер.Майский, 3

Июль, 2025г

Цель: знакомство родителей с опасностями, которые представляют эти насекомые, и правилами поведения при встрече с ними.

Задачи:

- повысить осведомлённость родителей о возможных рисках, связанных с насекомыми;
- научить родителей защищать детей от укусов, аллергических реакций и заболеваний, переносимых насекомыми.

Источник: <https://infourok.ru/beseda-ostorozhno-nasekomye-6123853.html>



если вас укусила пчела или оса

- обнаружив в месте укуса жало: осторожно удалите его пинцетом или ногтями. Не выдавливайте жало пальцами – это может привести к распространению яда
- протрите место укуса ватным тампоном, смоченным нашатырным спиртом, раствором йода или марганцовки
- приложите к месту укуса холод (лед оберните тканью) – это уменьшит боль и отек
- примите обильное питье (теплый чай, воду)
- при первых признаках аллергической реакции примите противоаллергические препараты
- при укусе насекомого в язык или во внутреннюю часть рта, горла, при первых признаках удушья и отека дыхательных путей немедленно вызовите скорую помощь

Первая помощь при укусах насекомых



Симптомы клещевого энцефалита

- высокая температура (до 40°)
- тошнота и рвота
- острая головная боль
- боли в суставах, мышцах и горле
- диарея
- потливость
- общая слабость



если вас укусил клещ



- захватите клеща пинцетом как можно ближе к его головке (хоботку) и удалите вращательным движением 1 – 3 оборота, стараясь не оторвать головку от туловища. Не сдавливайте брюшко клеща, не пытайтесь выдернуть его рывком или удалить при помощи иглы
- если туловище клеща оторвалось, примите меры для удаления головки (хоботка) из кожи
- после удаления клеща тщательно вымойте руки и пинцет, ранку смажьте зеленой или другим антисептическим средством
- обратитесь за помощью в лечебное учреждение

Важно

Внимание

Клещ может быть энцефалитным. Энцефалит – болезнь, приводящая к поражению центральной нервной системы и двигательного центра человека, в результате чего может развиваться паралич, а исходом стать многолетняя инвалидность или даже смерть

Клещевой энцефалит может никак себя не проявлять даже до 25 дней. В среднем инкубационный период длится от одной до двух недель

обратитесь в лечебное учреждение, если

1



отек продолжает увеличиваться в течение более одного дня после укуса

2



отек или боли мешают двигаться или заснуть

3



появились признаки инфицирования раны: усиление боли, отека и красноты места укуса, повышение температуры тела